

*** 内視鏡検査の時のみ、ご記入下さい。 ***

抗凝固剤・血小板凝集抑制剤に関して

内視鏡検査で生検・ポリープ切除術等を行った場合、出血が伴います。抗凝固剤・血小板凝集抑制剤の服用があれば休薬の必要があります。

もし、服薬の薬があれば休薬が可能かお知らせ下さい。

患者氏名 _____

抗凝固剤・血小板凝集抑制剤の服用 有 ・ 無

(有の場合)

服薬中の薬剤名 _____

休薬可能 ・ 休薬不可能 _____

コメント : _____

内視鏡検査にあたって注意すべき薬剤

| 商品名 | 成分名 | 休薬時点 | 術後休薬期間 | 種類 |
|------------------|------------------|--------|--------|--------------------|
| ワファリン錠 | ワルファリンカルシウム | 5～7日前 | 3～4日 | 抗凝固薬 |
| オパルモン錠、(プロレナル) | リマプロストアルファテクス | 2日前 | | 血管拡張薬 |
| ハイアスピリン錠、(ハファリン) | アスピリン | 7～14日前 | 4～5日 | 抗血小板薬 |
| ニチステート錠、(パナルジン) | 塩酸チクロピジン | 7～14日前 | 4～5日 | 抗血小板薬 |
| エパテールSカプセル | イコサペントエン酸エチル:EPA | 7～14日前 | 2～3日 | 抗血小板薬 |
| プラビックス錠 | クロピドグレル | 7～14日前 | | 抗血小板薬 |
| (プレタール) | シロスタゾール | 3～4日前 | 2～3日 | 抗血小板薬 |
| (プロサイリン、トルナー) | ベラプロストナトリウム | 1～2日前 | | 抗血小板薬 |
| (アソプレーグ) | 塩酸サルボグレレート | 1～2日前 | | 抗血小板薬 |
| (ロコナル) | トラビジル | 2～3日前 | | 狭心症治療薬 |
| コリアン錠 | 塩酸ジラセプロ | 1～2日前 | | 狭心症治療薬 |
| (ヘルサンチン) | ジヒピリタモール | 1～2日前 | | 狭心症治療薬 |
| キサンボンS錠、(カタクロット) | オザゲレルナトリウム | 1日前 | | くも膜下出血・ 脳血栓症治療薬 |

() は光生会病院未採用薬